核准日期：2007.03.28

修改日期：2010.10.01

修改日期：2015.12.01

# 肌苷注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】
通用名称：肌苷注射液
英文名称：Inosine Injection
汉语拼音：Jigan Zhusheye
【成份】
化学名称：9β-D-核糖次黄嘌呤
化学结构式：



分子式：$C_{10}H_{12}N_4O_5$；分子量：268.23
辅料：氢氧化钠；无水亚硫酸钠。
【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。
【适应症】临床用于白细胞或血小板减少症，各种急慢性肝脏疾患、肺原性心脏病等心脏疾患；中心性视网膜炎、视神经萎缩等疾患。
【规格】⑴2ml:50mg；⑵2ml:0.1g；⑶5ml:0.1g；⑷5ml:0.2g
【用法用量】⑴2ml:50mg 肌内注射，每次 100～200mg（2～4 支），每日 1～2 次；
⑵2ml:0.1g 肌内注射，每次 100～200mg（1～2 支），每日 1～2 次；
⑶5ml:0.1g 肌内注射，每次 100～200mg（1～2 支），每日 1～2 次；
⑷5ml:0.2g 肌内注射，每次 100～200mg（1/2～1 支），每日 1～2 次。
【不良反应】静脉注射偶有恶心、颜面潮红。
【禁忌】对本品过敏者禁用。
【注意事项】不能与乳清酸、氯霉素、双嘧达莫、硫喷妥钠等注射液配伍。
【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。
【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。
【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。
【药物相互作用】尚不明确。
【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。
【药理毒理】本品能直接透过细胞膜进入体细胞，活化丙酮酸氧化酶类，从而使处于低能缺氧状态下的细胞能继续顺利进行代谢，并参与人体能量代谢与蛋白质的合成。
【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。
【贮藏】遮光，密闭保存。
【包装】⑴2ml:50mg 2ml 安瓿，10 支/盒；⑵2ml:0.1g 2ml 安瓿，10 支/盒；
⑶5ml:0.1g 5ml 安瓿，10 支/盒；⑷5ml:0.2g 5ml 安瓿，10 支/盒。
【有效期】30 个月。
【执行标准】中国药典 2015 年版二部。
【批准文号】⑴2ml:50mg 国药准字 H37020614；⑵2ml:0.1g 国药准字 H37020615；
⑶5ml:0.1g 国药准字 H37020617；⑷5ml:0.2g 国药准字 H37020616。
【生产企业】

企业名称：山东新华制药股份有限公司
生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号
邮政编码：255005
电话号码：0533-2166666
传真号码：0533-2184991
网址：www.xhzy.com