



2300677

24C-2-054 2024.2.20 FPP/RJY Y0309K011B

国药准字 H37020634

重酒石酸去甲肾上腺素注射液

Noradrenaline Bitartrate Injection




6 921675 342056

重酒石酸去甲肾上腺素注射液

Noradrenaline Bitartrate Injection

2ml:10mg×10支

山东新华制药股份有限公司
SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.生产日期：
产品批号：
有效期至：

T1

药品追溯码
支付宝扫一扫

药品标识码：8348445 序列号：0008732701442

301031282B

核准日期：2007.04.23
修改日期：2010.10.01
修改日期：2012.10.01
修改日期：2015.12.01
修改日期：2019.01.01
修改日期：2020.12.01
修改日期：2024.03.12

重酒石酸去甲肾上腺素注射液
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：重酒石酸去甲肾上腺素注射液

英文名称：Noradrenaline Bitartrate Injection


汉语拼音：Zhongjiushisuan Qiaji Shenshangxiansu Zhusheyey

【成份】

主要成份：重酒石酸去甲肾上腺素，

化学名称：(R)-4-(2-氨基-1-羟基乙基)-1,2-苯二酚重酒石酸盐一水合物。

化学结构式：

分子式：C₈H₁₁NO₃·C₁₂H₁₃O₆·H₂O 分子量：337.28

辅料：鱼肝油酸钠（或亚硫酸钠）、氯化钠、注射用水

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体；遇光和空气易变质。

【适应症】用于治疗急性心肌梗死、体外循环等引起的低血压；对血容量不足所致的休克、低血压或嗜铬细胞瘤切除术后引起的低血压，本品作为急救时补充血容量的辅助治疗，以使血压回升，暂时维持脑与冠状动脉灌注，直到补充血容量治疗发生作用；也可用于椎管内阻滞时的低血压及心跳骤停复苏后血压维持。

【规格】2ml:10mg

【用法用量】用5%葡萄糖注射液或葡萄糖氯化钠注射液稀释后静滴。

成人常用量：开始以每分钟8~12μg速度滴注，调整滴速以达到血压升到理想水平；维持量为每分钟2~4μg。在必要时可按医嘱超越上述剂量，但需注意保持或补充血容量。

小儿常用量：开始按体重以每分钟0.02~0.1μg/kg速度滴注，按需要调节滴速。

【不良反应】

1. 药液外漏可引起局部组织坏死。

2. 本品强烈的血管收缩作用可使重要脏器器官血流减少，肾血流锐减后尿量减少，组织供血不足导致缺氧和酸中毒；持久或大量使用时，可使回心血量减少，外周血管阻力升高，心悸血容量减少，后果严重。

3. 应重视的反应包括肺动脉输注时沿静脉径路皮肤发白，注射局部皮肤破溃，皮肤紫绀，发红，严重眩晕，上述反应虽属少见，但后果严重。

4. 个别病人因过敏而有皮疹、面部水肿。

5. 在缺氧、电解质平衡失调、器质性心脏病病人中或过量时，可出现心律失常；血压升高后可出现反射

性心律失常。

6. 以下反应如持续出现应注意：焦虑不安、眩晕、头痛、皮肤苍白、心悸、失眠等。

7. 过量时可出现严重头痛及高血压、心率缓慢、呕吐、抽搐。

【禁忌】禁止与含卤素的麻醉剂和其他儿茶酚胺类药物合用，可卡因中毒及心动过速患者禁用。

【注意事项】缺氧、高血压、动脉硬化、甲状腺功能亢进症、糖尿病、闭塞性血管炎、血栓病患者慎用。用药过程中必须监测动脉压、中心静脉压、尿量、心电图。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇应权衡利弊慎用。

【儿童用药】小儿应选粗大静脉注射并需更换注射部位，在应用中至今未发现特殊问题。

【老年用药】老年人长期或大量使用，可使心排血量减低。

【药物相互作用】与全麻药如氟烷、环丙烷、氟烷等同用，可使心肌对拟交感胺类药物反应更敏感，容易发生室性心律失常，不宜同用，必须同用时应减量给药。

1. 与β受体阻滞剂同用，各自的疗效降低，β受体阻滞剂α受体作用突出，可发生高血压，心动过缓。

2. 与降压药同用可抵消或减弱降压药的作用，与甲基多巴同用还使本品加压作用增强。

3. 与洋地黄类同用，易致心律失常，需严密注意心电图监测。

4. 与其他拟交感胺类同用，心血管作用增强。

5. 与交感神经兴奋剂如麦角胺、麦角新碱或缩宫素同用，促使血管收缩作用加强，引起严重高血压，心动过缓。

6. 与三环类抗抑郁药合用，由于抑制组织吸收本品或增强肾上腺素受体的敏感性，可加强本品的心血管作用，引起心律失常、心动过速、高血压或高热，如必须合用，则开始本品用量需小，并监测心血管作用。

7. 与甲状腺激素同用二者作用均加强。

8. 与麦拉唑林同用可引起血压下降，继以血压过度反弹上升，故麦拉唑林过量时不宜用本品。

【药物过量】持久或大量使用时，可使回心血量减少，外周血管阻力升高，心排血量减少，后果严重，应即停药。适当补充液体及电解质，血压过高给予α受体阻滞剂，如酚妥拉明5~10mg静脉注射。

【药理毒理】本品为肾上腺素受体激动药。是强烈的α受体激动药，同时也激动β受体。通过α受体激动，可引起血管极度收缩，使血压升高，冠状动脉血流增加；通过β受体的激动，使心肌收缩加强，心排血量增加。用量按每分钟0.4μg/kg时，β受体激动为主；用较大剂量时，以α受体激动为主。

【药代动力学】皮下注射后吸收差，且易发生局部组织坏死。临床上一般采用静脉滴注，静脉给药后起效迅速，停止滴注后作用时效维持1~2分钟。主要在肝内代谢成无活性的代谢产物，经肾排泄，仅微量以原形排泄。

【贮藏】遮光，密封，在阴凉（不超过20℃）处保存。

【包装】2ml安瓶，10支/盒

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2020年版第一增补本

【批准文号】国药准字H37020634

【上市许可持有人】

名称：山东新华制药股份有限公司
注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区
邮政编码：255000
电话号码：0533-2166666
传真号码：0533-2164991
网址：www.xhzy.com

【生产企业】

企业名称：山东新华制药股份有限公司
生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号
邮政编码：255086
电话号码：0533-2196361
传真号码：0533-2196365
网址：www.xhzy.com

2ml:10mg×10支

重酒石酸去甲肾上腺素注射液

客户名称	山东新华制药股份有限公司			制 作	冯盼盼
产品名称	重酒石酸去甲肾上腺素注射液2ml10mg10支小盒			校 对	任建莹
成品尺寸	152*80*15mm	对此制版是否有改动意见		有 ☐	无 ☐
追溯码	条码宽度(mm)	36.108	条码高度(mm)	8	
请对此稿内容进行确认：文字\尺寸\版式\颜色\条码\追溯码					
客户签字	马建华 2024.3.10				
制 版 号	24C-2-054改2		日 期	2024.3.1	
山东鲁信天一印务有限公司					

材质：250G白卡
工艺：水性亮光