

肾上腺色腓片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名：肾上腺色腓片

汉语拼音：Kabakeluo Pian


英文名：Carbazochrome Tablets

【成份】

主要成份：肾上腺色腓

化学名称：3-羟基-1-甲基二氢吲哚-5,6-二酮缩氨脲。

化学结构式：



分子式：C₁₀H₁₂N₄O₃

分子量：236.23

【性状】 本品为糖衣片，除去糖衣后显橙色或橙红色。

【适应症】

适用于因毛细血管损伤及通透性增加所致的出血，如鼻衄、视网膜出血、咯血、胃肠出血、血尿、痔疮及子宫出血等。也用于血小板减少性紫癜，但止血效果不十分理想。

【规格】 1mg； 2.5mg； 5mg

【用法用量】

1mg： 口服： 一次 2.5~5.0mg ($2\frac{1}{2}$ ~5 片)，一日 3 次。

2.5mg 口服， 一次 2.5~5.0mg (1~2 片)，一日 3 次

5mg： 口服， 一次 2.5~5.0mg (1/2~1 片)，一日 3 次。

【不良反应】

本品毒性低，可产生水杨酸样反应，如恶心、呕吐、头晕、耳鸣、视力减退等。对癫痫病人可引起异常脑电活动。

【禁忌】 对水杨酸过敏者禁用。有癫痫病史及精神病史的患者慎用。

【注意事项】 尚不明确。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 尚不明确。

【儿童用药】 小儿小于 5 岁剂量减半，大于 5 岁同成人。

【老年用药】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】 抗组胺药、抗胆碱药的扩血管作用可影响本品的止血效果，如合并用药应加大本品剂量。

【药物过量】 大量使用者可引起精神紊乱，并易引起水杨酸样反应。

【药理毒理】

为肾上腺素的氧化衍生物，无拟肾上腺素作用，因此不影响血压和心率，但能增强毛细血管对损伤的抵抗力，稳定血管及其周围组织中的酸性粘多糖，降低毛细血管的通透性，增强受损毛细血管端的回缩作用，使血块不易从管壁脱落，从而缩短止血时间，但不影响凝血

过程。

【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】避光，密封保存。

【包装】塑料瓶包装:100片/瓶、1000片/瓶。

【有效期】24个月

【批准文号】1mg 国药准字 H37020330； 2.5mg H37020328； 5mg H37020329

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路14号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真：0533-2184991

网址：www.xhzy.com