

小儿氨酚匹林咖啡因片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：小儿氨酚匹林咖啡因片

英文名称：pediatric paracetamol、aspirin and caffeine tablets

汉语拼音：xiao' er anfenpilinkafeiyin pian

【成份】本品为复方制剂，其组分为每片含对乙酰氨基酚 63mg、阿司匹林 115mg、咖啡因 15mg。

【性状】本品为白色片。

【适应症】用于小儿感冒引起的发热，也用于缓解轻中度疼痛如关节痛、头痛、肌肉痛、牙痛等。

【规格】复方制剂，每片含对乙酰氨基酚 63mg、阿司匹林 115mg、咖啡因 15mg。

【用法用量】口服。3～6 岁：一次 1 片，一日 3 次；7～12 岁：一次 1.5～2 片，一日 3 次。

【不良反应】偶尔可引起恶心、呕吐、出汗、腹痛、皮肤苍白等，长期大量用药会导致肝、肾功能异常。

【禁忌】1.严重肝、肾功能不全患者禁用。2.对本品过敏者禁用。3、3 岁以下小儿禁用。

【注意事项】1.因疼痛服用此药时，不得连续使用 5 天以上，退热治疗不得超过 3 天，除非另有医嘱。

2.肾功能不全者长期大量使用本品，有增加肾脏毒性的危险，应慎用。

3.服用本品后出现红斑或水肿症状应立即停药。

4.本品仅为对症治疗药，在使用本品的同时，应尽可能进行病因治疗。

【孕妇及哺乳期妇女用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【儿童用药】3 岁以下小儿禁用。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】1、应用巴比妥类（如苯巴比妥）或解痉药（如颠茄）的患者，长期使用本品时可致肝脏损害。

2、本品与氯霉素同用时可增强后者的毒性。

【药物过量】药物过量可致肝肾功能衰竭。

【药理毒理】本品中对乙酰氨基酚作用是通过抑制下丘脑体温调节中枢前列腺素（ PEG_2 ）合成和释放而产生周围血管扩张，引起出汗以达到解热作用，同时能抑制缓激肽等的作用，提高痛阈而产生镇痛作用。

【药代动力学】本品口服后吸收迅速而完全，吸收后在体内分布均匀。本品主要在肝脏代谢，代谢产物从肾脏排泄。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】塑料瓶包装，30 片/瓶，50 片/瓶，100 片/瓶。铝塑包装，12 片/板。

【有效期】暂定 24 个月。

【执行标准】国家药品标准 WS-10001-（HD-0921）-2002-2009

【批准文号】国药准字 H37023817

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传 真：0533-2184991

网 址：www.Xhzy.com